Dans tous les exercices le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Exercice 4

- 1) Soit la fonction f définie sur $] -4, +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x+3}{x+4}$ soit C_f sa courbe représentative
 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Interpréter les résultats graphiquement.
 - b) Dresser le tableau de variation de f
- 2) a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J que l'on précisera.
 - b) Calculer $f^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ et $(f^{-1})'\left(-\frac{1}{2}\right)$
 - c) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.
- 3) a) Etudier la position relative de C_f et la droite $\Delta : y = x$
 - b) Tracer $C_f ; C_{f^{-1}}$ et Δ
- 4) Soit la suite (U_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $U_0 = -1$ et $U_{n+1} = f(U_n)$.
 - a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$ on a : $-1 \leq U_n \leq 1$
 - b) Montrer que la suite (U_n) est croissante.
 - c) En déduire que la suite (U_n) est convergente et calculer sa limite.
- 5) Soit la suite (V_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $V_n = \frac{U_n - 1}{U_n + 3}$
 - a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n V_k$
 - c) Exprimer U_n en fonction de n et retrouver la limite de (U_n) .

Exercice 5

Soit f la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{x^2 - 1} + x$

- 1) a) Montrer que f est dérivable sur $]1, +\infty[$
 - b) Montrer que f n'est pas dérivable à droite en 1, interpréter le résultat graphiquement.
 - c) Dresser le tableau de variation de f .
- 2) a) Montrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$
 - b) Montrer que pour tout $x \in [1, +\infty[$ on a : $f\left(\frac{x^2+1}{2x}\right) = x$
 - c) En déduire l'expression de $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in [1, +\infty[$
- 3) a) Montrer que pour tout $x \in [1, +\infty[$ on a : $f(x) = \frac{-1}{\sqrt{x^2-1}-x}$
 - b) Montrer que pour tout $x \in [1, +\infty[$ on a : $\sqrt{x^2-1} = \frac{1}{2}\left(f(x) - \frac{1}{f(x)}\right)$
 - c) En déduire l'expression de $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in [1, +\infty[$
- 4) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in [1, +\infty[$

c) Tracer la courbe représentative de f^{-1} dans le même repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

II) Soit g la fonction définie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ par $g(x) = f(\cos^2 x)$

1) Vérifier que pour tout x de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $g(x) = \frac{-2}{1+\sin x}$

2) Montrer que g réalise une bijection de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ sur $[-2, -1]$

3) a) Montrer que g^{-1} est dérivable sur $[-2, -1]$.

b) Montrer que pour tout $x \in [-2, -1]$ on a : $(g^{-1})' = \frac{-1}{x\sqrt{-(x+1)}}$

4) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $U_n = (n + n^2) \left[g^{-1} \left(-2 + \frac{1}{n} \right) - g^{-1} \left(-2 + \frac{1}{n+1} \right) \right]$

a) Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un réel $\alpha_n \in \left] -2 + \frac{1}{n+1}, -2 + \frac{1}{n} \right[$ tel que

$$U_n = \frac{-1}{\alpha_n \sqrt{-(1 + \alpha_n)}}$$

b) En déduire la limite de la suite U .

Cliquer ci-dessous pour la version PDF de la série

Fonctions réciproques 4^{ème} Sc Expérimentales

[Fonctions réciproques 4ème Sc Expérimentales](#)

une fonction réciproque f^{-1} définie sur $[-2, 0[$

b)

Méthode algébrique

On pose $\forall x \in]-\infty, 1]$ et $\forall X \in [-2, 0[, f^{-1}(x) = X \Leftrightarrow f(X) = x$

si $x \rightarrow -2^+$; $X \rightarrow 1^-$

$$f(1) = -2 \Leftrightarrow f^{-1}(-2) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{f^{-1}(x) - f^{-1}(-2)}{x + 2} = \lim_{X \rightarrow 1^-} \frac{X - 1}{f(X) - f(1)} = \lim_{X \rightarrow 1^-} \frac{1}{\frac{f(X) - f(1)}{X - 1}} = 0 \in \mathbb{R}$$

donc f est dérivable à gauche en -2

Méthode graphique

La courbe de f admet à gauche en 1 une demi tangente verticale, pour raison de symétrie avec la droite $\Delta: y = x$ la courbe de f^{-1} admet à droite en $f(1) = -2$ une demi tangente horizontale alors f est dérivable à droite en -2

c) Soit C la courbe de f et C' celle de f^{-1}

$$C' = S_{\Delta}(C) \text{ avec } \Delta: y = x$$

II) $g(x) = f(\cos^2 x)$; $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$

1) Pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ on a :

$$g(x) = f(\cos^2 x) = \frac{-2}{1 + \sqrt{1 - \cos^2 x}} = \frac{-2}{1 + \sqrt{\sin^2 x}} = \frac{-2}{1 + |\sin x|} = \frac{-2}{1 + \sin x} \text{ car } x \in [0, \frac{\pi}{2}] \text{ ainsi } g(x) = \frac{-2}{1 + \sin x}$$

2) Pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ on a :

2) a) f est continue et strictement décroissante sur $]0, 1]$ donc réalise une bijection de $]0, 1]$ sur

$$J = f(]0, 1]) = [f(1), \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) [= [0, +\infty[$$

b) f réalise une bijection de $]0, 1]$ sur $[0, +\infty[$

donc f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $[0, +\infty[$

c) $(C') = S_{\Delta}((C))$ avec $\Delta: y = x$

3) $g(x) = f(\cos^2 x)$; $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$

a) Pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$ on a :

$$: g(x) = f(\cos^2 x) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{\cos^2 x} - 1} = \frac{1}{2} \sqrt{1 + \tan^2 x - 1} = \frac{1}{2} \sqrt{\tan^2 x} = \frac{1}{2} |\tan x| = \frac{1}{2} \tan x$$

car $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$ donc $\tan x \geq 0$

ainsi pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$ on a : $g(x) = \frac{1}{2} \tan x$.

b) Soit h la fonction définie sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ par : $h(x) = g(x) - x$

Pour montrer que l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution α autre que 0 il suffit de montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α autre que 0

$x \mapsto \tan x$ est dérivable sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ donc g est dérivable sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ ainsi h est dérivable sur $[0, \frac{\pi}{2}[$

pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$; $h'(x) = (g(x) - x)' = g'(x) - 1 = \frac{1}{2}(1 + \tan^2 x) - 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \tan^2 x - 1$

$$= \frac{1}{2} \tan^2 x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (\tan^2 x - 1) = \frac{1}{2} (\tan x + 1)(\tan x - 1)$$

$\Leftrightarrow f(x) - x$ admet une unique solution α dans $[0, +\infty[$

$\Leftrightarrow f(x) = x$ admet une unique solution α dans $[0, +\infty[$

$$g(1) = f(1) - 1 = \frac{2}{\sqrt{2}} - 1 \approx 0,41 \quad ; \quad g(2) = f(2) - 2 = \frac{2}{\sqrt{3}} - 2 \approx -0,84$$

on a $g(1) \times g(2) < 0$ donc $1 < \alpha < 2$.

2) On a : $C_{f^{-1}} = S_{\Delta}(C_f)$ avec $\Delta: y = x$

$$f'(0) = -1 \quad \text{et} \quad f(0) = 2$$

$$T: y = f'(0)(x - 0) + f(0) \quad \text{donc} \quad T: y = -x + 2$$

voir traçage de C_f et $C_{f^{-1}}$ en fin de correction.

3) Pour tout $x \in [1, 2]$ on a : $f'(x) = \frac{-1}{(\sqrt{1+x})^3} \Rightarrow |f'(x)| = \frac{1}{(\sqrt{1+x})^3}$

$$\text{On a : } 1 \leq x \leq 2 \Rightarrow 2 \leq 1+x \leq 3 \Rightarrow \sqrt{2} \leq \sqrt{1+x} \leq \sqrt{3} \Rightarrow$$

$$2\sqrt{2} \leq (\sqrt{1+x})^3 \leq 3\sqrt{3} \Rightarrow \frac{1}{3\sqrt{3}} \leq \frac{1}{(\sqrt{1+x})^3} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} \Rightarrow |f'(x)| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

ainsi pour tout $x \in [1, 2]$ on a : $|f'(x)| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}$

4) On a : $\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

a) Pour $n = 0$ on a : $U_0 = 1$; $1 \leq U_0 \leq 2$ vrai

Soit $n \in \mathbb{N}$ supposons que $1 \leq U_n \leq 2$ et montrons que $1 \leq U_{n+1} \leq 2$

On a : $1 \leq U_n \leq 2$ et f est décroissante sur $[0, +\infty[$ donc $f(2) \leq f(U_n) \leq f(1) \Rightarrow$

$$1 < \frac{2}{\sqrt{3}} \leq U_{n+1} \leq \frac{2}{\sqrt{2}} < 2 \Rightarrow 1 \leq U_{n+1} \leq 2$$

Conclusion pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $1 \leq U_n \leq 2$

b) On a : f est dérivable sur $[1, 2]$

$$\left\{ \begin{array}{l} |f'(x)| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} ; \forall x \in [1, 2] \text{ donc d'après le corollaire du théorème des} \\ \alpha \in [1, 2] \text{ et } U_n \in [1, 2] \end{array} \right.$$

inégalités des accroissements finis, on a : $|f(U_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |U_n - \alpha|$

ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |U_n - \alpha|$

c) Pour $n = 0$ on a : $|U_0 - \alpha| = |1 - \alpha| \leq 1 = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^0$ car $1 \in [1, 2]$ et $\alpha \in [1, 2]$

Soit $n \in \mathbb{N}$ supposons que $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n$ et montrons que $|U_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^{n+1}$

$$\text{On a } |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n \text{ donc } \frac{1}{2\sqrt{2}} |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} \times \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n$$

$$\text{ainsi } \frac{1}{2\sqrt{2}} |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^{n+1} \text{ et comme } |U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |U_n - \alpha| \text{ alors } |U_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^{n+1}$$

conclusion pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n$

d) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$

On a : $U_{n+1} = g^{-1}(U_n) \Leftrightarrow L = g^{-1}(L) \Leftrightarrow L = \alpha$ ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$

6) Soit la suite S_n définie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ par $S_n = \sum_{k=0}^n \left[g^{-1}\left(\frac{k+1}{2}\right) - g^{-1}\left(\frac{k}{2}\right) \right]$; $n \in \mathbb{N}$

$$S_n = g^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) - g^{-1}\left(\frac{0}{2}\right) + g^{-1}\left(\frac{2}{2}\right) - g^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + g^{-1}\left(\frac{3}{2}\right) - g^{-1}\left(\frac{2}{2}\right) + \dots + g^{-1}\left(\frac{n+1}{2}\right) - g^{-1}\left(\frac{n}{2}\right)$$

$$= -g^{-1}\left(\frac{0}{2}\right) + g^{-1}\left(\frac{n+1}{2}\right) = g^{-1}\left(\frac{n+1}{2}\right) \text{ ainsi } S_n = g^{-1}\left(\frac{n+1}{2}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} g^{-1}\left(\frac{n+1}{2}\right) \text{ or } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} g^{-1}(x) = \frac{\pi}{2} \text{ ainsi } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{\pi}{2}$$

Exercice 15

1) $f(x) = \frac{-2}{1+\sqrt{1-x}}$; $x \in]-\infty, 1]$

$$1) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{-2}{1+\sqrt{1-x}} + 2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2\sqrt{1-x}}{(x-1)(1+\sqrt{1-x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2\sqrt{1-x}}{(1-x)(1+\sqrt{1-x})} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2\sqrt{1-x}}{(\sqrt{1-x})^2(1+\sqrt{1-x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2}{\frac{(1-x)(1+\sqrt{1-x})}{1}} = -\infty$$

alors f n'est pas dérivable à gauche en 1 et la courbe représentative de f admet à gauche en 1 une demi tangente verticale dirigée vers le haut.

2) a) Pour tout $x \in]-\infty, 1[$ on a :

$$f'(x) = -2 \left(\frac{\frac{1}{2\sqrt{1-x}}}{(1+\sqrt{1-x})^2} \right) = -2 \left(\frac{1}{2\sqrt{1-x}(1+\sqrt{1-x})^2} \right) = -\frac{4}{4\sqrt{1-x}(1+\sqrt{1-x})^2}$$

$$= -\frac{1}{4\sqrt{1-x}} \times \frac{4}{(1+\sqrt{1-x})^2} = -\frac{1}{4\sqrt{1-x}} \left(\frac{2}{1+\sqrt{1-x}} \right)^2 = -\frac{1}{4\sqrt{1-x}} \times f^2(x) = -\frac{f^2(x)}{4\sqrt{1-x}} \text{ ainsi } f'(x) = -\frac{f^2(x)}{4\sqrt{1-x}}$$

b) Pour tout $x \in]-\infty, 1[$ on a : $f'(x) = -\frac{f^2(x)}{4\sqrt{1-x}} < 0$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{1+\sqrt{1-x}} = 0 \quad f(1) = -2$$

c) Voir traçage de la courbe représentative à la fin de la correction de la partie I

3) a) La fonction f est continue et strictement décroissante sur $]-\infty, 1]$ donc f réalise une bijection de $]-\infty, 1]$ sur $f(]-\infty, 1]) = [f(1), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) [= [-2, 0[$ ainsi f admet

$$g'(x) = \frac{-2(-\cos x)}{(1+\sin x)^2} = \frac{2\cos x}{(1+\sin x)^2} \geq 0 \text{ car } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]; \cos x \geq 0$$

$$g'(x) = 0; \cos x = 0; x = \frac{\pi}{2}$$

ainsi g est strictement croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

On a g est continue et strictement croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

donc g réalise une bijection de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ sur $g\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) = \left[g(0), g\left(\frac{\pi}{2}\right)\right] = [-2, -1]$

car $g(0) = f(\cos^2 0) = f(1) = -2$ et $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\cos^2 \frac{\pi}{2}\right) = f(0) = -1$

3) a) On a : g est dérivable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]; g'(x) \neq 0$

donc g^{-1} est dérivable sur $g\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) = [-2, -1[$

b) pour $x \in [-2, -1[$ et $y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ on a $g^{-1}(x) = y \Leftrightarrow g(y) = x$

$$\text{pour tout } x \in [-2, -1[\text{ on a : } (g^{-1})'(x) = \frac{1}{g'(g^{-1}(x))} = \frac{1}{g'(y)} = \frac{1}{\frac{2\cos y}{(1+\sin y)^2}} = \frac{(1+\sin y)^2}{2\cos y}$$

$$g(y) = x \Leftrightarrow \frac{-2}{1+\sin y} = x \Leftrightarrow \frac{1+\sin y}{-2} = \frac{1}{x} \Leftrightarrow 1 + \sin y = -\frac{2}{x} \text{ et } \sin y = -\frac{2+x}{x}$$

on a $\cos^2 y + \sin^2 y = 1 \Leftrightarrow \cos^2 y = 1 - \sin^2 y \Rightarrow \cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y}; y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

$$\cos y = \sqrt{1 - \left(\frac{2+x}{x}\right)^2} = \sqrt{\frac{x^2 - 4 - 4x - x^2}{x^2}} = \frac{2\sqrt{-(x+1)}}{|x|} = -\frac{2\sqrt{-(x+1)}}{x} \text{ car } x < 0$$

par la suite pour tout $x \in [-2, -1[$ on a : $(g^{-1})'(x) = -\frac{\frac{4}{x^2}}{\frac{4\sqrt{-(x+1)}}{x}} = \frac{-1}{x\sqrt{-(x+1)}}$ ainsi $(g^{-1})'(x) = \frac{-1}{x\sqrt{-(x+1)}}$

4) a) on a : $n \geq 1 \Rightarrow 0 < \frac{1}{n} \leq 1 \Rightarrow -2 < -2 + \frac{1}{n} \leq -1$ donc $-2 + \frac{1}{n} \in [-2, -1]$

et $n+1 \geq 2 \Rightarrow 0 < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -2 < -2 + \frac{1}{n+1} \leq -\frac{3}{2}$ donc $-2 + \frac{1}{n+1} \in [-2, -1]$

$n+1 > n \Rightarrow \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \Rightarrow -2 + \frac{1}{n+1} < -2 + \frac{1}{n}$

on a g^{-1} est continue sur $\left[-2 + \frac{1}{n+1}, -2 + \frac{1}{n}\right]$ dérivable sur $\left]-2 + \frac{1}{n+1}, -2 + \frac{1}{n}\right[$ alors il existe un réel

$$\alpha_n \in \left]-2 + \frac{1}{n+1}, -2 + \frac{1}{n}\right[\text{ tel que } \frac{g^{-1}\left(-2 + \frac{1}{n+1}\right) - g^{-1}\left(-2 + \frac{1}{n}\right)}{-2 + \frac{1}{n+1} - \left(-2 + \frac{1}{n}\right)} = (g^{-1})'(\alpha_n)$$

$$\text{or } \frac{g^{-1}\left(-2 + \frac{1}{n+1}\right) - g^{-1}\left(-2 + \frac{1}{n}\right)}{-2 + \frac{1}{n+1} - \left(-2 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{g^{-1}\left(-2 + \frac{1}{n+1}\right) - g^{-1}\left(-2 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}} = \frac{g^{-1}\left(-2 + \frac{1}{n+1}\right) - g^{-1}\left(-2 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{-1}{n+n^2}}$$

$$= (n+n^2) \left(g^{-1}\left(-2 + \frac{1}{n}\right) - g^{-1}\left(-2 + \frac{1}{n+1}\right) \right)$$

$$= U_n$$

d'autre part $(g^{-1})'(\alpha_n) = \frac{-1}{\alpha_n \sqrt{-(\alpha_n+1)}}$

$$\text{ainsi } U_n = \frac{-1}{\alpha_n \sqrt{-(\alpha_n+1)}}$$

b) on a : pour tout $n \in \mathbb{N}^*; U_n = \frac{-1}{\alpha_n \sqrt{-(\alpha_n+1)}}$

donc $h'(x)$ prend le signe de $\tan x - 1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ car $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ on a : $\tan x \geq 0 \Rightarrow \tan x + 1 > 0$

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow \tan x - 1 = 0 \Leftrightarrow \tan x = 1 \text{ ainsi } x = \frac{\pi}{4}$$

$x \mapsto \tan x$ est croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

** Si $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \Rightarrow 0 \leq \tan x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \tan x - 1 \leq 0$ ainsi $h'(x) \leq 0$

** Si $\frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{2}$ on a : $\tan x \geq 1 \Rightarrow \tan x - 1 \geq 0$ ainsi $h'(x) \geq 0$

$$h(0) = g(0) = \frac{1}{2} \tan(0) = 0 \quad h\left(\frac{\pi}{4}\right) = g\left(\frac{\pi}{4}\right) - \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) - \frac{\pi}{4} \approx -0,29$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} h(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} g(x) - x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \tan x - x = +\infty$$

** on a h est continue et strictement décroissante sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ donc h réalise une bijection de $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ sur

$h\left(\left[0, \frac{\pi}{4}\right]\right) = \left[h\left(\frac{\pi}{4}\right), h(0)\right] = \left[\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}, 0\right]$ or $0 \in \left[\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}, 0\right]$ donc l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution or $h(0) = 0$ ainsi 0 est l'unique solution $h(x) = 0$ dans $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$

** on a h est continue et strictement croissante sur $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ donc h réalise une bijection de $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ sur

$h\left(\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]\right) = \left[h\left(\frac{\pi}{4}\right), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} h(x)\right] = \left[\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}, +\infty\right]$ or $0 \in \left[\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}, +\infty\right]$ donc l'équation $h(x) = 0$ admet une

unique α dans $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ et comme $h\left(\frac{\pi}{3}\right) = g\left(\frac{\pi}{3}\right) - \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) - \frac{\pi}{3} \approx -0,18 < 0$ et $h\left(\frac{\pi}{4}\right) < 0$ alors

$h(x) = 0$ n'admet pas de solutions dans $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right]$ ainsi $h(x) = 0$ admet une unique solution dans $\alpha \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$

Conclusion : $h(x) = 0$ admet une unique solution α autre que 0 et que $\alpha \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$

Ainsi l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution α autre que 0 et que $\alpha \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$

c) On a pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$; $g(x) - x = h(x)$ donc $g(x) - x$ prend le signe de $h(x)$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Or d'après le tableau de variations de h :

** $h(x) \leq 0$ si $x \in [0, \alpha]$ donc $g(x) - x \leq 0$

** $h(x) \geq 0$ si $x \in [\alpha, \frac{\pi}{2}]$ donc $g(x) - x \geq 0$

position relative de Δ et (C_g)
Intersection $(0,0)$ (α, α)

4) a) On a pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$; $g(x) = \frac{1}{2} \tan x$ et $x \mapsto \tan x$ est dérivable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ainsi g est dérivable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$; pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$; $g'(x) = \left(\frac{1}{2} \tan x\right)' = \frac{1}{2}(1 + \tan^2 x) > 0$

g est continue et strictement croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ donc g réalise une bijection de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ sur

$g\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) = \left[g(0), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} g(x)\right] = [0, +\infty[$ ainsi g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur $J = [0, +\infty[$

b) On pose $g^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = y$; $y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \Leftrightarrow g(y) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \tan y = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \tan y = \sqrt{3}$ donc $y = -\frac{2\pi}{3}$ ou $y = \frac{\pi}{3}$ or $y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ donc $y = \frac{\pi}{3}$ ainsi $g^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$

$(g^{-1})'\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{g'(g^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right))} = \frac{1}{g'\left(\frac{\pi}{3}\right)} = \frac{1}{\frac{1}{2}[1 + \tan^2\left(\frac{\pi}{3}\right)]} = \frac{2}{1 + (\sqrt{3})^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ainsi $(g^{-1})'\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2}$

c) g est dérivable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$; $g'(x) \neq 0$ donc g^{-1} est dérivable sur

$g\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) = [0, +\infty[$ et

$$(g^{-1})'(x) = \frac{1}{g'(g^{-1}(x))} = \frac{1}{g'(y)}$$

or $y = g^{-1}(x) \Leftrightarrow g(y) = x \Leftrightarrow \frac{1}{2} \tan y = x \Leftrightarrow \tan y = 2x$ ainsi

$$(g^{-1})'(x) = \frac{1}{g'(2x)} = \frac{1}{\frac{1}{2}[1 + (2x)^2]} = \frac{2}{4x^2 + 1} \quad \text{ainsi } (g^{-1})'(x) = \frac{2}{4x^2 + 1}$$

5) $U_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $U_{n+1} = g^{-1}(U_n)$; $\forall n \in \mathbb{N}$

a) Pour $n = 0$ on a $U_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ donc $\frac{\sqrt{3}}{2} \leq U_0 \leq \alpha$

Soit $n \in \mathbb{N}$; supposons que $\frac{\sqrt{3}}{2} \leq U_n \leq \alpha$ et montrons que $\frac{\sqrt{3}}{2} \leq U_{n+1} \leq \alpha$

On a g est croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ donc g^{-1} est croissante sur $g\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) = [0, +\infty[$

On a $\frac{\sqrt{3}}{2} \leq U_n \leq \alpha \Rightarrow g\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \leq g(U_n) \leq g(\alpha) \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} < \frac{\pi}{3} \leq U_{n+1} \leq \alpha \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \leq U_{n+1} \leq \alpha$

Conclusion pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $\frac{\sqrt{3}}{2} \leq U_n \leq \alpha$.

b) On a d'après 3) c) la courbe de (C_g) de g est au dessous de Δ pour tout $x \in [0, \alpha]$ et comme (C_g) et $(C_{g^{-1}})$ sont symétriques par rapport à Δ donc $(C_{g^{-1}})$ est au dessus de Δ ainsi pour tout $x \in [0, \alpha]$ $g^{-1}(x) > x$, or $0 < \frac{\sqrt{3}}{2} \leq U_n \leq \alpha$ donc $g^{-1}(U_n) > U_n$ ainsi $U_{n+1} > U_n$ alors la suite (U_n) est croissante.

b) La suite (U_n) est croissante et majorée par α donc la suite (U_n) est convergente et converge vers un réel L

on a g^{-1} est continue sur $\left[\frac{\sqrt{3}}{2}, \alpha\right]$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = L$ donc $L \in \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, \alpha\right]$ ainsi g^{-1} est continue en L

Exercice 13

Soit la fonction f définie sur $]0, 1[$ par : $f(x) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{x}} - 1$ et soit (C) sa courbe représentative.

- 1) a) Etudier la dérivabilité de f à gauche en 1 et interpréter le résultat graphiquement.
b) Montrer que f est dérivable sur $]0, 1[$ et pour tout $x \in]0, 1[$ on a : $f'(x) = \frac{-1}{4x^2\sqrt{\frac{1}{x}-1}}$
c) Dresser le tableau de variation de f .
- 2) a) Montrer que f réalise une bijection de $]0, 1[$ sur un intervalle J que l'on précisera.
b) Montrer f admet une fonction réciproque f^{-1} et déterminer son domaine de définition.
c) Tracer (C) et (C') courbe représentative de f^{-1} .
- 3) Soit g la fonction définie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ par : $g(x) = f(\cos^2 x)$. Soit (C_g) sa courbe représentative.
a) Montrer que pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ on a : $g(x) = \frac{1}{2} \tan x$.
b) Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution α autre que 0 et que $\alpha \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right[$.
c) Etudier la position relative de la droite $\Delta: y = x$ et la courbe (C_g) .
- 4) a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J que l'on précisera.
b) Calculer $g^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ et $(g^{-1})'\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
c) Montrer que g^{-1} est dérivable sur J et que pour tout $x \in J$ on a : $(g^{-1})'(x) = \frac{2}{4x^2+1}$.
- 5) Soit la suite (U_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $U_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$ on a : $U_{n+1} = g^{-1}(U_n)$.
a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $\frac{\sqrt{3}}{2} \leq U_n \leq \alpha$.
b) Montrer que la suite (U_n) est croissante.
c) En déduire que la suite (U_n) est convergente et déterminer sa limite.
- 6) Soit la suite S_n définie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ par $S_n = \sum_{k=0}^n \left[g^{-1}\left(\frac{k+1}{2}\right) - g^{-1}\left(\frac{k}{2}\right) \right]$; $n \in \mathbb{N}$

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{\pi}{2}$

Exercice 15

1) Soit f la fonction définie sur $]-\infty, 1[$ par : $f(x) = \frac{-2}{1+\sqrt{1-x}}$

- 1) Etudier la dérivabilité de f à gauche en 1 . Interpréter graphiquement le résultat obtenu.
- 2) a) Montrer que pour tout $x \in]-\infty, 1[$ on a : $f'(x) = -\frac{[f(x)]^2}{4\sqrt{1-x}}$
b) Dresser le tableau de variation de .
c) Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- 3) a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $[-2, 0[$
b) Étudier la dérivabilité de f^{-1} à droite en -2 .

Exercice 4

$$1) f(x) = \frac{2x+3}{x+4} ; x \in]-4, +\infty[$$

$$a) \lim_{x \rightarrow -4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{2x+3}{x+4} = -\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+3}{x+4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x} = 2$$

La droite d'équation $x = 4$ est une asymptote verticale à C_f à droite en 4

La droite d'équation $y = 2$ est une asymptote horizontale à C_f au voisinage de $+\infty$

b) f est dérivable sur $] -4, +\infty[$ et pour tout $x \in] -4, +\infty[$ on a :

$$f'(x) = \left(\frac{2x+3}{x+4} \right)' = \frac{2(x+4) - (2x+3)}{(x+4)^2} = \frac{2x+8-2x-3}{(x+4)^2} = \frac{5}{(x+4)^2} > 0$$

2) a) f est continue et strictement croissante sur $] -4, +\infty[$ donc f réalise une bijection de $] -4, +\infty[$ sur

$$J = f(]-4, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow -4^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=] -\infty, +2[\text{ donc } f \text{ admet une fonction réciproque } f^{-1}$$

définie sur $] -\infty, +2[$.

$$b) \text{ On pose } f^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = y ; (y \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow f(y) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{2y+3}{y+4} = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow 4y+6 = -y-4$$

$$\text{donc } 5y = -10 \text{ donc } y = -2 \text{ ainsi } f^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = -2$$

$$(f^{-1})'\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right)} = \frac{1}{f'(-2)} = \frac{1}{\frac{5}{4}} = \frac{4}{5} \text{ ainsi } (f^{-1})'\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{5}$$

c) On pose $f^{-1}(x) = y$ ($x \in \mathbb{R}$) $\Leftrightarrow f(y) = x$ ($y \in] -4, +\infty[$)

$$f(y) = x \Leftrightarrow \frac{2y+3}{y+4} = x \Leftrightarrow 2y+3 = yx+4x \Leftrightarrow 2y-yx = 4x-3 \Leftrightarrow y(2-x) = 4x-3 \Leftrightarrow$$

$$y = \frac{4x-3}{2-x} \text{ ainsi } \forall x \in \mathbb{R} ; f^{-1}(x) = \frac{4x-3}{2-x}$$

3) a) Pour tout $x \in] -4, +\infty[$; on a :

$$f(x) - x = \frac{2x+3}{x+4} - x = \frac{2x+3}{x+4} - \frac{-x^2-4x}{x+4} = \frac{-x^2-2x+3}{x+4}$$

donc $f(x) - x$ prend le signe de $-x^2 - 2x + 3$ sur $] -4, +\infty[$ ($x > -4 \Rightarrow x+4 > 0$)

$$f(x) - x = 0 \Leftrightarrow -x^2 - 2x + 3 = 0 \quad x = 1 \text{ ou } x = -3$$

b) $C_{f^{-1}} = S_{\Delta}(C_f)$ avec $\Delta: y = x$

4) $U_0 = -1$; $U_{n+1} = f(U_n)$; $n \in \mathbb{N}$

a) Pour $n = 0$ on a : $U_0 = -1$; $-1 \leq U_0 \leq 1$ vrai

Soit $n \in \mathbb{N}$; supposons que $-1 \leq U_n \leq 1$ et montrons que $-1 \leq U_{n+1} \leq 1$

on a $-1 \leq U_n \leq 1$ et f est continue et croissante sur $[-1, 1]$ donc

$$f(-1) \leq f(U_n) \leq f(1) \Rightarrow -1 < \frac{1}{3} \leq U_{n+1} \leq 1 \Rightarrow -1 \leq U_{n+1} \leq 1$$

conclusion $\forall n \in \mathbb{N}$ on a : $-1 \leq U_n \leq 1$

b) On a pour tout $x \in [-3, 1]$ d'après 3) a) $f(x) - x \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq x$

or $-1 \leq U_n \leq 1$ donc $f(U_n) \geq U_n \Rightarrow U_{n+1} > U_n$

ainsi la suite (U_n) est croissante.

c) La suite (U_n) est croissante et majorée par 1 donc la suite (U_n) est convergente

on a : f est continue sur $[-1, 1]$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = L$; $L \in [-1, 1]$ donc f est continue en L

$$-2 + \frac{1}{n+1} < \alpha_n < -2 + \frac{1}{n} \quad \Leftrightarrow \quad 2 - \frac{1}{n} < -\alpha_n < 2 - \frac{1}{n+1}$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{1}{n} < -\alpha_n - 1 < 1 - \frac{1}{n+1} \quad \Leftrightarrow \quad 1 - \frac{1}{n} < -(\alpha_n + 1) < 1 - \frac{1}{n+1} \quad \Leftrightarrow$$

$$\sqrt{1 - \frac{1}{n}} < \sqrt{-(\alpha_n + 1)} < \sqrt{1 - \frac{1}{n+1}} \quad \Leftrightarrow$$

$$\left(2 - \frac{1}{n}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{n}} < -\alpha_n \sqrt{-(\alpha_n + 1)} < \left(2 - \frac{1}{n+1}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{n+1}} \quad \text{car } -\alpha_n > 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\frac{1}{\left(2 - \frac{1}{n+1}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{n+1}}} < \frac{1}{-\alpha_n \sqrt{-(\alpha_n + 1)}} < \frac{1}{\left(2 - \frac{1}{n}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{n}}} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{\left(2 - \frac{1}{n+1}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{n+1}}} < \frac{-1}{\alpha_n \sqrt{-(\alpha_n + 1)}} < \frac{1}{\left(2 - \frac{1}{n}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{n}}} \quad \Leftrightarrow$$

$$\frac{1}{\left(2 - \frac{1}{n+1}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{n+1}}} < U_n < \frac{1}{\left(2 - \frac{1}{n}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{n}}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(2 - \frac{1}{n+1}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{n+1}}} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(2 - \frac{1}{n}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{n}}} = \frac{1}{2} \quad \text{alors} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \frac{1}{2}$$

<http://mathematiques.kooli.me/>

Exercice 13

$$f(x) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{x}} - 1; \quad x \in]0, 1[$$

$$\begin{aligned}
 1) \ a) \ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{x}} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1-x}{x}}}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{1-x}{x}}\right)^2}{(x-1)\sqrt{\frac{1-x}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1-x}{x}\right)}{(x-1)\sqrt{\frac{1-x}{x}}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-1)}{2x(x-1)\sqrt{\frac{1-x}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-1}{2x\sqrt{\frac{1-x}{x}}} = -\infty
 \end{aligned}$$

donc f n'est pas dérivable à gauche en 1 et (C) admet à gauche en 1 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

b) $x \mapsto \frac{1}{x} - 1$ est dérivable et strictement positif sur $]0, 1[$ $\left[0 < x < 1 \Rightarrow \frac{1}{x} > 1 \Rightarrow \frac{1}{x} - 1 > 0 \right]$

$x \mapsto \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{x}} - 1$ est dérivable sur $]0, 1[$

ainsi f est dérivable sur $]0, 1[$

pour tout $x \in]0, 1[$ on a : $f'(x) = \left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{x}} - 1\right)' = \frac{1}{2}\left(\frac{-1}{x^2}\right) = \frac{-1}{4x^2\sqrt{x}-1}$

c) pour tout $x \in]0, 1[$ on a : $f'(x) = \frac{-1}{4x^2\sqrt{x}-1} < 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{x}} - 1 = +\infty; \quad f(1) = 0$$

c) f est pas dérivable sur $]1, +\infty[$ et pour tout $x \in]1, +\infty[$ on a :

$$f'(x) = (\sqrt{x^2-1} + x)' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}} + 1 = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} + 1 > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2-1} + x = +\infty$$

2) a) f est continue et strictement croissante sur $]1, +\infty[$ donc f réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur $f(]1, +\infty[) = [f(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[= [1, +\infty[$

b) Pour tout $x \in]1, +\infty[$ on a :

$$\begin{aligned} f\left(\frac{x^2+1}{2x}\right) &= \sqrt{\left(\frac{x^2+1}{2x}\right)^2 - 1} + \frac{x^2+1}{2x} = \sqrt{\frac{x^4+2x^2+1}{4x^2} - 1} + \frac{x^2+1}{2x} = \sqrt{\frac{x^4+2x^2+1-4x^2}{4x^2}} + \frac{x^2+1}{2x} \\ &= \sqrt{\frac{x^4-2x^2+1}{4x^2}} + \frac{x^2+1}{2x} = \sqrt{\frac{(x^2-1)^2}{(2x)^2}} + \frac{x^2+1}{2x} = \frac{|x^2-1|}{|2x|} + \frac{x^2+1}{2x} \end{aligned}$$

or pour tout $x \in]1, +\infty[$ on a : $x^2 - 1 \geq 0$ et $2x > 0$ donc $\frac{|x^2-1|}{|2x|} = \frac{x^2-1}{2x}$

ainsi pour tout $x \in]1, +\infty[$ on a : $f\left(\frac{x^2+1}{2x}\right) = \frac{x^2-1}{2x} + \frac{x^2+1}{2x} = \frac{2x^2}{2x} = x$

c) Pour tout $x \in]1, +\infty[$ on a : $f\left(\frac{x^2+1}{2x}\right) = x$

ainsi pour tout $x \in]1, +\infty[$ on a : $f^{-1}(x) = \frac{x^2+1}{2x}$

3) a) Pour tout $x \in]1, +\infty[$ on a :

$$f(x) = \sqrt{x^2-1} + x = \frac{(\sqrt{x^2-1}+x)(\sqrt{x^2-1}-x)}{\sqrt{x^2-1}-x} = \frac{x^2-1-x^2}{\sqrt{x^2-1}-x} = \frac{-1}{\sqrt{x^2-1}-x}$$

ainsi que pour tout $x \in]1, +\infty[$ on a : $f(x) = \frac{-1}{\sqrt{x^2-1}-x}$

b) Pour tout $x \in]1, +\infty[$ on a :

$$\frac{1}{2}\left(f(x) - \frac{1}{f(x)}\right) = \frac{1}{2}\left(\sqrt{x^2-1} + x - \frac{-1}{\sqrt{x^2-1}-x}\right) = \frac{1}{2}(\sqrt{x^2-1} + x + \sqrt{x^2-1} - x) = \sqrt{x^2-1}$$

ainsi pour tout $x \in]1, +\infty[$ on a : $\sqrt{x^2-1} = \frac{1}{2}\left(f(x) - \frac{1}{f(x)}\right)$

c) Pour tout $x \in]1, +\infty[$ on a :

$$\sqrt{x^2-1} = \frac{1}{2}\left(f(x) - \frac{1}{f(x)}\right) \Leftrightarrow \sqrt{x^2-1} + x = \frac{1}{2}\left(f(x) - \frac{1}{f(x)}\right) + x \Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - \frac{1}{f(x)}\right) + x$$

on pose $f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow f(y) = x$

$x \in]1, +\infty[\quad y \in]1, +\infty[$

$$U_{n+1} = f(U_n) \text{ donc } L = f(L) \Leftrightarrow L = \frac{2L+3}{L+4} \Leftrightarrow L^2 + 4L = 2L + 3 \Leftrightarrow L^2 + 2L - 3 = 0$$

donc $L = 1$ ou $L = -3$ or $L \in [-1, 1]$ donc $L = 1$

ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 1$

5) $V_n = \frac{U_n - 1}{U_n + 3}; n \in \mathbb{N}$

a) $V_{n+1} = \frac{U_{n+1} - 1}{U_{n+1} + 3} = \frac{\frac{2U_n + 3}{U_n + 4} - 1}{\frac{2U_n + 3}{U_n + 4} + 3} = \frac{\frac{2U_n + 3 - U_n - 4}{U_n + 4}}{\frac{2U_n + 3 + 3U_n + 12}{U_n + 4}} = \frac{U_n - 1}{5U_n + 15} = \frac{U_n - 1}{5(U_n + 3)} = \frac{1}{5} \left(\frac{U_n - 1}{U_n + 3} \right) = \frac{1}{5} V_n$

donc la suite (V_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$ et de premier terme $V_0 = \frac{U_0 - 1}{U_0 + 3} = \frac{-2}{2} = -1$

b) La suite (V_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$ et $-\frac{1}{5} < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 0$

$$\sum_{k=0}^n V_k = V_0 \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right) = - \left[\frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{5}} \right] = - \left[\frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}}{\frac{4}{5}} \right] = -\frac{5}{4} \left[1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n V_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{5}{4} \left[1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \right] = -\frac{5}{4} \text{ ainsi } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n V_k = -\frac{5}{4}$$

c) $V_n = \frac{U_n - 1}{U_n + 3} \Leftrightarrow V_n U_n + 3V_n = U_n - 1 \Leftrightarrow V_n U_n - U_n = -3V_n - 1 \Leftrightarrow U_n (V_n - 1) = -3V_n - 1 \Leftrightarrow$

$$U_n = \frac{-3V_n - 1}{V_n - 1}$$

or (V_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$ et de $V_0 = -1$ donc $V_n = V_0 q^n = -\left(\frac{1}{5}\right)^n$ donc

$$U_n = \frac{3 \left(\frac{1}{5}\right)^n - 1}{-\left(\frac{1}{5}\right)^n - 1} \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 \overbrace{\left(\frac{1}{5}\right)^n}^0 - 1}{-\left(\frac{1}{5}\right)^n - 1} = \frac{-1}{-1} = 1 \text{ ainsi } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 1$$

Exercice 5

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1} + x; x \in [1, +\infty[$$

1) a) $x \mapsto x^2 - 1$ est dérivable et strictement positive sur $]1, +\infty[$ ($x > 1 \Rightarrow x^2 > 1 \Rightarrow x^2 - 1 > 0$)

$x \mapsto \sqrt{x^2 - 1}$ est dérivable sur $]1, +\infty[$

$x \mapsto \sqrt{x^2 - 1} + x$ est dérivable sur $]1, +\infty[$

ainsi f est pas dérivable sur $]1, +\infty[$

b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) + f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2 - 1} + x - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1} + \frac{x - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{(x - 1)\sqrt{x^2 - 1}} + 1$
 $= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)\sqrt{x^2 - 1}} + 1 = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 - 1}} + 1 = +\infty$

ainsi f n'est pas dérivable à droite en 1 et la courbe de f admet à droite en 1 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

$$f(y) = x \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(f(y) - \frac{1}{f(y)} \right) + y = x \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right) + y = x \Leftrightarrow \frac{x^2-1}{2x} + y = x \Leftrightarrow y = x - \frac{x^2-1}{2x} \Leftrightarrow y = \frac{2x^2}{2x} - \frac{x^2-1}{2x} \Leftrightarrow y = \frac{x^2+1}{2x} \text{ donc } f^{-1}(x) = \frac{x^2+1}{2x}$$

ainsi pour tout $x \in [1, +\infty[$ on a : $f^{-1}(x) = \frac{x^2+1}{2x}$

4) on pose $f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow f(y) = x$
 $x \in [1, +\infty[\quad y \in [1, +\infty[$

$$f(y) = x \Leftrightarrow \sqrt{y^2-1} + y = x \Leftrightarrow \sqrt{y^2-1} = x - y \Leftrightarrow y^2 - 1 = (x - y)^2 \Leftrightarrow y^2 - 1 = x^2 - 2xy + y^2 \Leftrightarrow 2xy - x^2 = 1 \Leftrightarrow 2xy = x^2 + 1 \Leftrightarrow y = \frac{x^2+1}{2x}$$

ainsi pour tout $x \in [1, +\infty[$ on a : $f^{-1}(x) = \frac{x^2+1}{2x}$

Exercice 8

1) a) Pour tout $x \in [0, +\infty[$ on a : $1+x > 0$ ainsi f est pas dérivable sur $[0, +\infty[$

$$f'(x) = \left(\frac{2}{\sqrt{1+x}} \right)' = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{1+x}} \right)' = 2 \left(\frac{-1}{2\sqrt{1+x}^3} \right) = \frac{-1}{(\sqrt{1+x})^3} < 0$$

$$f(0) = 2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{1+x}} = 0$$

b) On a f est continue et strictement décroissante sur $[0, +\infty[$ donc f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J = f([0, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(0) \right] =]0, 2]$

c) Posons $f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow f(y) = x$
 $x \in [2, 0[\quad y \in [0, +\infty[$

$$f(y) = x \Leftrightarrow \frac{2}{\sqrt{1+y}} = x \Leftrightarrow \sqrt{1+y} = \frac{2}{x} \Leftrightarrow 1+y = \frac{4}{x^2} \Leftrightarrow y = \frac{4-x^2}{x^2}$$

ainsi pour tout $x \in [2, 0[$ on a : $f^{-1}(x) = \frac{4-x^2}{x^2}$

d) Soit g la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par : $g(x) = f(x) - x$
 pour tout $x \in [0, +\infty[$ on a : $g'(x) = (f(x) - x)' = f'(x) - 1 < 0$

on a g est continue et strictement décroissante sur $[0, +\infty[$ donc g réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $g([0, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x), g(0) \right]$

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) = 2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = -\infty$$

ainsi $g([0, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x), g(0) \right] =]-\infty, 2]$

or $0 \in]-\infty, 2]$ donc $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0, +\infty[$