

Exercice 1

On note (E_n) l'équation $(E_n) : \frac{x^3}{x^2+1} = n$

1. Montrer que pour tout entier $n \geq 0$, l'équation (E_n) possède une unique solution, notée x_n , sur \mathbb{R} .
2. Quelle est la monotonie de la suite $(x_n)_n$?
3. Montrer que $\forall n \geq 1, n \leq x_n \leq n+1$
4. En déduire la limite de la suite $(x_n)_n$ et donner son équivalent.

Exercice 2

On définit une fonction f sur \mathbb{R} par $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

1. Justifier que f réalise une bijection de \mathbb{R} sur un intervalle à expliciter.
2. Montrer que pour tout entier n , l'équation $f(x) = \frac{1}{n}$ admet une et une seule solution dans \mathbb{R} . On note x_n cette solution.
3. Montrer que $\forall n \geq 0, x_n \geq 0$ puis déterminer la monotonie de la suite $(x_n)_n$
4. Déterminer alors la limite de la suite $(x_n)_n$

Exercice 3

On considère la fonction $f(x) = e^x + x$.

1. Montrer que f réalise une bijection de \mathbb{R} sur un intervalle à expliciter.
2. Justifier que pour tout entier positif n , l'équation $f(x) = n$ possède une unique solution que l'on notera par la suite x_n .
3. Quelle est la monotonie de la suite x_n .
4. Démontrer que $\forall n \geq 1, \ln(n - \ln n) \leq x_n \leq \ln n$.
5. En déduire la limite de la suite (x_n) puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{\ln n}$.

Exercice 4

On considère l'équation $(E_n) : x \ln x = n$

1. Montrer que pour tout entier $n \geq 0$, l'équation (E_n) possède une unique solution, notée x_n , sur $[1, +\infty[$.

2. Quelle est la monotonie de la suite $(x_n)_n$? Montrer que $\forall n \geq 1, x_n \leq n$.

3. En déduire que $\forall n \geq 2, x_n \geq \frac{n}{\ln n}$ puis que $x_n \leq \frac{n}{\ln n - \ln(\ln n)}$.

4. A l'aide de l'encadrement obtenu à la question 3, calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln n)x_n}{n}$.

Exercice 5

Posons $f_n(x) = x^n + 1 - nx$.

1. Montrer que, pour chaque entier $n \geq 2$, l'équation $x^n + 1 = nx$ possède une unique solution dans l'intervalle $[0, 1]$. On note x_n cette racine.
2. Justifier que $\forall n \geq 2, \frac{1}{n} \leq x_n \leq \frac{2}{n}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.
3. En utilisant l'égalité $f_n(x_n) = 0$, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n$.
En déduire un équivalent de x_n .
4. Etudier le signe de $f_{n+1}(x) - f_n(x)$. En évaluant en $x = x_n$, en déduire le signe de $f_{n+1}(x_n)$.
5. Déterminer la monotonie de la suite $(x_n)_n$.

Exercice 6

Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on définit la fonction f_n par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, f_n(x) = x^n + 9x^2 - 4.$$

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ n'a qu'une seule solution positive, notée u_n .
2. Calculer u_1 et u_2 et vérifier que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \in]0, \frac{2}{3}[$.
3. Montrer que, pour tout x élément de $]0, 1[$, on a : $f_{n+1}(x) < f_n(x)$.
4. En évaluant l'inégalité précédente en $x = u_n$, déterminer le signe de $f_{n+1}(u_n)$.
Quelle est alors la monotonie de la suite (u_n) ?
5. Montrer que la suite (u_n) est convergente. On note λ sa limite.
6. A l'aide de la question 2., encadrer $(u_n)^n$ puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^n$
En déduire la limite de $(4 - 9u_n^2)$ et expliciter λ .